



POLLASTRE

DATI TECNICI

Consistenza media	80000	n°
Peso medio acquisto	0.041	kg/capo
Peso medio vendita	2.2	kg/capo
Mortalità	8	%
Vuoto sanitario per ciclo	30	giorni
Consumo di mangime aziendale (da report)	20.53	kg/capo/anno

ALIMENTAZIONE PER FASI

	Durata fase giorni	Proteina grezza mangimi* %	Fosforo mangimi* %
- fase 1	21	19	0.74
- fase 2	21	17.3	0.72
- fase 3	77	13	0.71
- fase 4	28	13.5	0.59
- fase 5	0	0	0
- fase 6	0	0	0
Durata ciclo	147		

* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

RISULTATI DI BILANCIO

Fattore di riduzione azoto escreto	30.5215	%	segno + significa riduzione
Escrezione N (calcolo aziendale)	285.8545	kgN/t peso vivo	
Escrezione N pollastre (peso medio 0.7 kg)	0.2001	kgN/posto/anno	
Escrezione P pollastre (peso medio 0.7 kg)	0.1603	kgP2O5/posto/anno	

Indici tecnici

Fattore di correzione kc	1.9797	n. cicli/anno
Variazione di peso vivo	4.2742	kg/capo/anno
Indice di conversione	4.44	kg/kg t.q.
Consumo di mangime (stima modello)	18.9774	kg/capo/anno

Consumo di mangime (calcolo aziendale)	20.53	kg/capo/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	1.0818	
Contenuto medio di PG mangimi	14.5667	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0.0233	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0.0069	kg/kg t.q.

Bilancio dell'azoto, kg/capo/anno

k_Nr pollastre	0.037	kgN/kg carne
k_volatilizzazione	0.3	%
Consumo da modello	0.4422	kgN/capo/anno
Consumo corretto su dato aziendale	0.4784	kgN/capo/anno
Ritenzione	0.1581	kgN/capo/anno
Escrezione (calcolo aziendale)	0.3203	kgN/capo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	0.2242	kgN/capo/anno
N al campo da DM 25/02/2016 (peso medio = 1 kg)	0.23	kgN/capo/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	285.8545	kgN/t peso vivo
N al campo da DM 25/02/2016	288	kgN/t peso vivo
Escrezione N da DM 25/02/2016	411.4286	kgN/t peso vivo

N al
campo
per:

	peso	kgN/ capo/ anno	kgN/t peso vivo
polli da carne	1.0	0.25	250.0
pollastre	0.8	0.23	288.0
tacchini m.	9.0	1.49	165.0
tacchini f.	4.5	0.76	168.0
faraone	0.8	0.19	240.0

Bilancio del fosforo, kg/capo/anno

k_Pr avicoli da carne	0.007	kgP/kg carne
Consumo P (calcolo aziendale)	0.1417	kg/capo/anno
Ritenzione P	0.0299	kg/capo/anno
Escrezione P	0.1118	kg/capo/anno

Produzione aziendale di Azoto e Fosforo al campo, kg/anno

Produzione N da bilancio aziendale	17936	kg N/anno
N al campo da DM 25/02/16	18400	kg N/anno
Produzione P da bilancio aziendale	8944	kg P/anno